

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Pacjent powinien :

- 7 dni** przed badaniem unikać owoców i warzyw pestkowych ,
pieczywa z dodatkiem ziaren ,
- 48 godz.** przed badaniem spożywać produkty ubogoresztkowe (ryż , makaron ,
mięsa i ryby gotowane , buliony , herbata , napoje klarowne niegazowane) ,
- 24 godz.** przed badaniem spożywać produkty (buliony , zupy przecierane ,
herbata , woda niegazowana) ,
- 12 godz.** przed badaniem spożywać tylko napoje klarowne niegazowane ,
- 3 godz.** przed badaniem nie pić .

Dodatkowe wytyczne :

- Leki zażywane na stałe należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza
- Receptę na lek oczyszczający jelita (Fleet Phospho-soda lub CitraFleet)
uzyskujemy od lekarza POZ lub kierującego .

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM BADANIE OKOŁO GODZ. 21.00 NALEŻY ZASTOSOWAĆ 1-SZĄ DAWKĘ LEKU OCZYSZCZAJĄCEGO JELITA .

DRUGĄ DAWKĘ LEKU OCZYSZCZAJĄCEGO JELITA NALEŻY ZAŻYĆ NA 5 H PRZED PLANOWANĄ GODZ. BADANIA. LEK ZAPIJAMY DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY

**Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia pod koniec treścią płynną.
Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.**

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Pacjent powinien :

- 7 dni** przed badaniem unikać owoców i warzyw pestkowych ,
pieczywa z dodatkiem ziaren ,
- 48 godz.** przed badaniem spożywać produkty ubogoresztkowe (ryż , makaron ,
mięsa i ryby gotowane , buliony , herbata , napoje klarowne niegazowane) ,
- 24 godz.** przed badaniem spożywać produkty (buliony , zupy przecierane ,
herbata , woda niegazowana) ,
- 12 godz.** przed badaniem spożywać tylko napoje klarowne niegazowane ,
- 3 godz.** przed badaniem nie pić .

Dodatkowe wytyczne :

- Leki zażywane na stałe należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza
- Receptę na lek oczyszczający jelita (Fleet Phospho-soda lub CitraFleet)
uzyskujemy od lekarza POZ lub kierującego .

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM BADANIE OKOŁO GODZ. 21.00 NALEŻY ZASTOSOWAĆ 1-SZĄ DAWKĘ LEKU OCZYSZCZAJĄCEGO JELITA .

DRUGĄ DAWKĘ LEKU OCZYSZCZAJĄCEGO JELITA NALEŻY ZAŻYĆ NA 5 H PRZED PLANOWANĄ GODZ. BADANIA. LEK ZAPIJAMY DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY

**Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia pod koniec treścią płynną.
Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.**